

Evaluación de los riesgos y síntomas de la degeneración macular asociada con la edad

La degeneración macular asociada con la edad (AMD, por sus siglas en inglés) es la causa principal de la pérdida de visión entre los envejecientes estadounidenses. Es un trastorno ocular progresivo en el que una parte de la retina, llamada mácula, se deteriora con la edad. La mácula es responsable de la visión central y nos permite hacer cosas como leer, ver televisión, reconocer caras y conducir.

Factores de riesgo para el AMD

Existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar AMD, incluyendo los siguientes. Marque todos los que correspondan:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 50 años de edad o mayor | <input type="checkbox"/> Fumador actual o en el pasado |
| <input type="checkbox"/> Historial de familia de AMD | <input type="checkbox"/> Sobrepeso |
| <input type="checkbox"/> Caucásico (blanco) | <input type="checkbox"/> Enfermedad del corazón, presión arterial alta o nivel de colesterol alto |

Debido a que la disminución de la vista nocturna es un síntoma común del AMD, usamos el AdaptDx® para medir la cantidad de minutos que le toma adaptarse de la luz brillante a la oscuridad. Este número es su RI,™ o Rod Intercept,™ cual nos ayuda a detectar el AMD en sus primeras etapas. La prueba AdaptDx no es invasiva y tarda de 5 a 10 minutos para completar.

Primeros síntomas del AMD

Antes de que se puedan ver cambios estructurales en la parte posterior del ojo, usted puede tener los siguientes síntomas primarios. Marque todos los que correspondan:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dificultad para ver de noche | <input type="checkbox"/> Dificultad para conducir de noche | <input type="checkbox"/> Dificultad para leer con luz tenue |
| <input type="checkbox"/> Vista distorsionada o borrosa | <input type="checkbox"/> Cambios recientes en la visión | |

Nombre del paciente

Firma del paciente

Fecha